



DIRECTION REGIONALE DE

L'ENVIRONNEMENT

BASSE - NORMANDIE

DATE: 19/09/96

07.01-02/5878

Étude ornithologique du Marais du Véret

(Calvados)

Franck Morel

Étude réalisée par le
Groupe Ornithologique Normand
Université 14032 Caen Cedex

à la demande de
La DIREN de Basse-Normandie

Septembre 1996

Introduction

Le marais du Véret situé sur les communes de Grandcamp-Maisy et Cricqueville-en-Bessin (Calvados) est principalement composé de prairies humides parcourues par de nombreux fossés et cours d'eau lents et abritant plusieurs mares à gabion.

Ce site bien délimité topographiquement en arrière du plateau qui se termine par les falaises est bien connu sur le plan ornithologique pour ses niches, mais la pression de chasse exercée de mi-juillet à fin février en rend l'accès quasiment impossible ; de ce fait les recensements hivernaux ont été moins nombreux et sont donc moins précis.

Cette étude a été menée à la demande de la DIREN, dans le cadre des études visant à mieux définir les ZNIEFF. Afin d'avoir des données fiables sur l'intérêt ornithologique de ce marais, des sorties ont été effectuées cette année et une analyse rétrospective des connaissances antérieures a été réalisée.

Pour les oiseaux, les différents biotopes significatifs sont :

- les cours d'eau lents et la végétation qui les borde (roselières, ronciers etc. ...),
- les mares à gabions,
- les prairies de fauche,
- les prairies pâturées,
- les haies qui séparent le marais du bocage et des collines avoisinantes,
- la proximité du littoral et du bocage qui permet des échanges entre chacun de ces deux milieux et le marais.

Résultats spécifiques

L'ordre systématique qui sera suivi est l'ordre habituel utilisé par le GONm, mis à jour par G. Debout (1992). Toutes les observations depuis le début des années 1970 ont été prises en compte afin d'inclure celles des hivers rigoureux, périodes où les potentialités du marais apparaissent pleinement.

Grand cormoran

Quelques individus sont observés sur les cours d'eau en hiver mais cette espèce se contente généralement de survoler le marais entre dortoir et zone de nourrissage.

Héron cendré

De l'été à la fin de l'hiver, quelques individus viennent se nourrir sur le marais.

Aigrette garzette

Depuis quelques années cette espèce connaît une nette progression en Normandie, elle est maintenant régulièrement observée sur le marais se nourrissant en bordure des cours d'eau et des mares. Quatre étaient présentes le 3/04/96.

Spatule blanche

Observée exceptionnellement, principalement lors de la migration pré-nuptiale.

Cygnes

Lorsque des vagues de froid entraînent l'arrêt de la chasse comme cela a été le cas en janvier 1979, le marais du Véret peut accueillir, de quelques jours à quelques semaines, des cygnes de trois espèces :

le cygne tuberculé mais surtout le cygne sauvage et le cygne de Bewick ; ces deux derniers sont des hivernants rares en Normandie dont la présence est étroitement liée aux coups de froid.

Oie cendrée

Elle semble attirée par le marais où elle est régulièrement observée lors des migrations en effectif le plus souvent inférieur à dix individus. Bien évidemment, en raison de la chasse un stationnement prolongé n'est pas possible.

Tadorne de Belon

Espèce nicheuse sur le marais. Son installation semble remonter à 1985, année où un couple est observé pour la première fois, "effectif" demeurant à ce niveau jusqu'en 1988. Puis une augmentation est constatée avec cinq couples en 1989, et six à sept en 1990. Depuis, il semble qu'une baisse ait eu lieu, puisqu'en 1995 trois couples, seulement, sont présents, et au printemps 1996 deux ou trois sont cantonnés.

Canard colvert

Quelques individus en hivernage. La chasse empêche le stationnement régulier de cette espèce.

Sarcelle d'hiver

Présente en hiver en faible effectif (rarement plus de dix).

D'autres canards de surface comme le **siffleur**, **souchet** ou **pilet** sont probablement présents sur le site en hiver, mais n'ayant pas accès aux carnets de chasse, il nous est difficile d'estimer la fréquentation des canards qui viennent au gagnage la nuit et se posent sur les mares à gabion.

Buse variable

Parfois observée tournoyant au dessus du marais.

Bondrée apivore

Espèce occasionnelle : deux ont été observées en mai 1994.

Faucon pèlerin

Un individu en novembre 1991. Il s'agissait probablement d'un des individus qui hivernent en baie des Veys et qui viennent parfois le long des falaises du Bessin. Vue la position géographique du marais, il est probable que cette espèce y passe de temps en temps.

Faucon crécerelle

C'est une espèce qui apprécie les espaces découverts pour repérer ses proies. Elle est régulièrement observée sur le marais à la recherche de micro-mammifères.

Caille des blés

Deux en mai 1977. Il est possible qu'elle ait été présente depuis, mais la détection de cette espèce discrète demanderait une plus forte prospection.

Poule d'eau

Les nombreux canaux présents sur le marais constituent un milieu favorable à cette espèce. Elle est présente toute l'année, quelques couples nichent.

Vanneau huppé

En hivernage, présence irrégulière, probablement en liaison avec le dérangement. Les effectifs peuvent atteindre quelques dizaines. Il est surtout intéressant de noter que le marais accueille depuis plusieurs années quelques couples reproducteurs. Les premières données de nidification datent de 1973, année où un couple est observé. Les années suivantes voient les effectifs augmenter :

année	nombre de couples
1977	5 à 6
1978	> 4
1979	5 à 8
1980	> 3
1981	4
1985	> 3
1987	10
1989	6 à 10
1990	10
1992	> 2

La chute apparente de 1992 semble ne pas se confirmer en 1995 : cinq couples sont présents, quatre ou cinq sont présents le 03/04/96 et cinq à six couples paraissent cantonnés sur le site le 17/04/96.

Pluvier doré

La présence en hivernage semble occasionnelle (12 en décembre 1989). Au passage cette espèce est régulièrement observée mais en faible effectif (10, le 27/03/96 et 3 le 17/04/96).

Grand gravelot

Il est régulièrement observé en hiver et aux passages sur le littoral. Quelques individus viennent parfois sur le marais (3 le 27/03/96).

Bécassine des marais

Semble bien représentée en hivernage, régulièrement plus de dix individus en novembre. Également notée au passage : sept, le 17/04/96. La présence d'un individu, le 21 avril 1990 mérite également d'être soulignée car, à cette date, la nidification de cette espèce serait possible.

Courlis cendré

Présence irrégulière, en hivernage : huit en janvier 1993. Lors de vague de froid les effectifs peuvent être plus importants : 20 en janvier 1979.

Courlis corlieu

Espèce régulièrement observée en avril - mai mais très peu lors de la migration post-nuptiale probablement en raison du dérangement occasionné par la chasse.

Chevalier arlequin

Espèce présente lors du passage pré-nuptial le plus souvent en effectif réduit.

Chevalier gambette

Au passage pré-nuptial, présence régulière d'une dizaine d'individus sur les mares à gabion (9, le 17/04/96). Les effectifs peuvent parfois atteindre une cinquantaine.

Chevalier aboyeur

Quelques individus de passage sont observés lors de la migration pré-nuptiale. Les effectifs les plus souvent observés sont de l'ordre de 20 à 30 individus.

Chevalier culblanc

Quelques individus de passage lors de la migration, avant la réouverture de la chasse.

Chevalier guignette

Quelques individus isolés au moment des migrations.

Chevalier combattant

Observé en migration pré-nuptiale, le plus souvent en effectif inférieur à 20 ou 30. Signalons tout de même la présence de 47 individus, le 17/04/96.

Goéland marin

Il est de plus en plus souvent posé sur le marais.

Goéland brun

La proximité du littoral fait qu'il est parfois posé sur le marais.

Goéland argenté

Le marais étant situé en bordure du littoral, cette espèce y est régulièrement observée au cours de l'année. Les survols du marais par les laridés qui partent le matin dans les terres et reviennent le soir en dortoir le long de la côte sont fréquents.

Goéland cendré

Observé durant l'hiver et au moment des migrations, parfois en effectif important.

Mouette rieuse

Espèce présente à partir de la fin de l'été, jusqu'au printemps suivant. Le marais sert de zone de gagnage pour cette espèce.

Pigeon ramier

Espèce régulière dans les haies bordant le marais.

Tourterelle des bois

Parfois observée sur le marais. Cette espèce est simplement de passage, elle doit venir du bocage avoisinant.

Tourterelle turque

Observée de temps en temps, elle doit nicher dans les hameaux proches.

Coucou gris

Deux mâles chanteurs à proximité du marais, le 17/04/96. Il est possible que cette espèce niche sur le marais ou dans les haies avoisinantes car de nombreuses espèces "hôtes" sont présentes.

Martinet noir

Régulièrement observé, se nourrissant au dessus du marais.

Alouette des champs

Présente toute l'année. Plusieurs chanteurs survolent le marais au moment de la reproduction.

Hirondelles de fenêtre, rustique et de rivage

Présentes régulièrement en faible effectif mais certains jours d'essai-mage d'insectes, ces trois espèces peuvent être observées en grand nombre.

Pipit farlouse :

Hivernant, nicheur assez commun : quelques dizaines d'individus.

Bergeronnette flavéole :

Espèce nicheuse bien représentée.

Bergeronnette printanière

Espèce observée régulièrement au moment des migrations, elle ne niche pas sur le marais.

Bergeronnette grise

Parfois observée à proximité des mares.

Pie-grièche écorcheur

Observée exceptionnellement. Un mâle le 11 juin 1987.

Troglodyte mignon

Sédentaire assez commun, entendu une bonne partie de l'année mais principalement en période de reproduction dans les haies bordant le marais.

Accenteur mouchet

Quelques individus.

Traquet tarier

Chaque année, cette espèce est notée au passage (3 le 17/04/96) mais elle ne semble pas nicher sur le site.

Traquet motteux :

Quelques individus régulièrement observés durant les migrations.

Rouge gorge

Sédentaire assez commun, dans les haies bordant le marais.

Grive litorne

Observée en hiver et lors des migrations. Les effectifs peuvent atteindre plusieurs centaines.

Grive mauvis

Cette espèce est souvent observée avec la grive litorne. Quelques centaines d'individus ont parfois été observées.

Merle noir

Sédentaire assez commun dans les haies bordant le marais.

Grive musicienne

Quelques chanteurs sont entendus en période de reproduction.

Grive draine

Un ou deux couples.

Bouscarle de Cetti

Quelques chanteurs sont entendus en période de reproduction. Cette espèce est un sédentaire devenu assez rare en Normandie suite aux hivers froids de 1985-1987. La population nicheuse qui était estimée à environ 1000 couples au début des années 1980 doit être actuellement comprise entre 100 à 300 couples.

Phragmite des joncs

Quelques dizaines d'individus sont présents en période de reproduction dans les roselières bordant les cours d'eau.

Rousserolle verderolle

Quelques couples dans les roselières.

Rousserolle effarvate

Comme la verderolle, quelques couples sont présents dans les roselières.

Fauvette des jardins

Espèce parfois observée en bordure du marais.

Fauvette à tête noire

La plus fréquente des fauvettes est bien représentée dans les haies bordant le marais.

Fauvette babillarde

Espèce bien représentée en période de reproduction dans les haies et dans les ronciers. Il y a au moins dix mâles chanteurs sur l'ensemble du marais.

Fauvette grisette

Espèce régulièrement observée ou entendue en bordure du marais.

Cisticole des joncs

Deux données, en juillet 1980 et 1981, montre que le site pourrait accueillir à nouveau cette espèce si elle se réimplante en Normandie.

Pouillot fitis

Au moins un mâle chanteur, le 17/04/96 en bordure du marais.

Pouillot véloce

Nicheur assez commun.

Gobemouche gris

Quelques individus de passage

Mésange à longue queue

Quelques individus occasionnellement observés en petit groupe en bordure du marais.

Mésange bleue

Observée toute l'année dans les haies bordants le marais.

Mésange charbonnière

Elle est comme la mésange bleue observée toute l'année en bordure de marais.

Bruant jaune

Espèce assez bien représentée

Bruant des roseaux

Quelques individus présents toute l'année.

Pinson des arbres

Quelques couples présents toute l'année.

Verdier d'Europe

Quelques individus.

Chardonneret élégant

Régulièrement observé en bordure de marais ou le survolant en bande de quelques individus.

Linotte mélodieuse

Présente toute l'année.

Bouvreuil pivoine

Parfois observé sur le marais. Cette espèce provient sûrement du bocage situé à proximité.

Moineau domestique

Quelques individus présent toute l'année. Cette espèce doit certainement nicher à proximité du marais.

Étourneau sansonnet

Présent une bonne partie de l'année, parfois en effectif important

Pie bavarde

Quelques individus présents toute l'année.

Corneille noire

Quelques couples se nourrissent régulièrement sur le marais.

Conclusion

Malgré sa superficie relativement réduite (141 ha), le marais paraît avoir un intérêt départemental et même au seuil du niveau régional pour **ses nicheurs**, notamment pour deux d'entre eux :

- le tadorne de Belon : la population nicheuse normande qui était estimée entre 1985 et 1988 à un peu plus de trois cents couples montre l'intérêt régional du marais du Véret qui a abrité six à sept couples en 1990.

- le vanneau huppé : c'est une espèce chassable et précoce dans sa nidification ; l'interdiction de la chasse durant le mois de février, époque à laquelle les vanneaux commencent à se cantonner permettrait probablement une augmentation des effectifs nicheurs.

L'installation de la bécassine des marais en tant qu'espèce nicheuse reste possible puisqu'elle est parfois encore présente fin avril. Ces observations tardives sont intéressantes puisque seuls quelques dizaines de couples nichent en Normandie.

Au total 29 espèces nichent régulièrement sur le site. Parmi les passe-reaux, signalons une **population intéressante de fauvette babillarde et phragmite des joncs**.

En **période internuptiale**, la chasse réduit les fortes potentialités du site, qui ne peuvent s'exprimer que lors des circonstances exceptionnelles comme en janvier 1979 lorsque les autorités ont décidé une fermeture temporaire de la chasse suite à une forte vague de froid. Lors de ces froids intenses des espèces nordiques viennent se réfugier en Normandie, de ce fait, les effectifs de certains limicoles et anatidés sont plus importants et des espèces, jamais observées habituellement sur le marais, peuvent stationner tels les cygnes sauvage et de Bewick.

Le marais du Véret présente un intérêt tout particulier du fait de sa localisation, à proximité de la baie des Veys. Actuellement ce sont près de 80 espèces qui sont régulièrement observées sur le site. Sa richesse avifaunistique pourrait être cependant accrue avec l'arrêt de la chasse et une meilleure gestion, comprenant notamment la remontée des niveaux d'eau au printemps, facile à réaliser vu la topographie du site.

Dans ces conditions, ce marais bien abrité pourrait devenir un site remarquable et servir de refuge à de nombreuses espèces aquatiques.

**Liste alphabétique et statut des différentes espèces
observées sur le marais du Véret**

Espèces régulièrement observées :

Accenteur mouchet	H		N
Aigrette garzette	H		E
Alouette des champs	H		N
Bécassine des marais	H	P	
Bergeronnette flavéole		N	
Bergeronnette grise	H		E
Bergeronnette printanière		P	
Bouscarle de Cetti	H?		N
Bouvreuil pivoine	P		
Bruant jaune	H		N
Bruant des roseaux	H		N
Buse variable	H		E
Canard colvert	H		
Canard pilet	H	P	
Canard siffleur	H	P	
Canard souchet	H	P	
Chardonneret élégant	H		E
Chevalier aboyeur		P	
Chevalier arlequin	P		
Chevalier culblanc	P		
Chevalier combattant		P	
Chevalier gambette		P	
Chevalier guignette		P	
Corneille noire	H		E
Courlis cendré	H	P	
Courlis corlieu		P	
Coucou gris		N	
Étourneau sansonnet	H		E
Faucon crécerelle	H		E
Fauvette à tête noire			N
Fauvette babillarde			N
Fauvette des jardins			E
Fauvette grisette		N	
Grive draine	H		N
Grive litorne	H	P	
Grive mauvis	H	P	
Grive musicienne	H		N?
Gobemouche gris	P		
Goéland argenté	H	P	E
Goéland brun		P	
Goéland marin	H	P	
Goéland cendré	H	P	
Grand cormoran	H		
Grand gravelot	H	P	
Héron cendré	H		
Hirondelle de fenêtre	P	E	
Hirondelle de rivage		P	E

Hirondelle rustique		P	E
Linotte mélodieuse	H		E
Martinet noir		P	E
Merle noir	H		N
Mésange à longue queue	P		
Mésange bleue	H		N
Mésange charbonnière	H		N
Moineau domestique	H		E
Mouette rieuse	H		
Oie cendrée		P	
Phragmite des joncs			N
Pie bavarde	H		E
Pigeon ramier	H		N
Pinson des arbres	H		N
Pipit farlouse	H		N
Pluvier doré	H	P	
Pouillot fitis		N	
Pouillot véloce			N
Poule d'eau	H		N
Rouge gorge	H		N
Rousserolle effarvate		N	
Rousserolle verderolle		N	
Sarcelle d'hiver	H		
Tadorne de Belon	H		N
Traquet tarier			N
Traquet motteux	P		
Troglodyte mignon	H		N
Tourterelle des bois			E
Tourterelle turque	H		E
Vanneau huppé	H	P	N
Verdier d'Europe	H		E

Espèces observées occasionnellement :

Bondrée apivore		E
Caille des blés	P	
Cisticole des joncs (actuellement disparue de Normandie)		
Cygne tuberculé	H	
Cygne sauvage	H	
Cygne de Bewick	H	
Faucon pèlerin		P
Pie-grièche écorcheur (actuellement plus présente sur le site)		
Spatule blanche		P

H : Hivernant

E : Estivant

N : Nicheur

P : de Passage lors des migrations, ou espèce qui provient des environs du marais mais qui y est parfois observée.